

Se va a proceder a su vacunación durante la jornada de hoy. La vacuna a usar será la de AstraZeneca, cuyo uso está recomendado para personas nacidas entre 1956 y 2003, ambos inclusive.

Esta vacuna requiere de dos inyecciones que se administran de forma intramuscular, habitualmente en la parte superior del brazo. Entre la administración de la primera y la segunda dosis deberán pasar aproximadamente 3 meses.

Contraindicaciones o precauciones

Antes de la administración de la vacuna, por favor revise la lista siguiente y marque si procede en la casilla de la izquierda si cumple alguno de los criterios en ella descritos:

	CUESTIONARIO	MEDIDAS A ADOPTAR
	¿Ha padecido reacción alérgica grave o inmediata a dosis previas de esta vacuna o a alguno de sus componentes como polisorbato y polietilenglicol?	Contraindicación absoluta
	¿Ha pasado el COVID19, con o sin síntomas, en los últimos 6 meses?	Posponer la vacunación
	¿Padece alguna enfermedad aguda moderada-grave o fiebre >38°C?	Posponer la vacunación
	¿Padece mastocitosis?	Posponer la vacunación
	¿Tiene antecedentes de reacción alérgica a otras vacunas o tratamientos inyectables?	Observar 30 minutos
	¿Ha recibido alguna vacuna en los últimos 14 días?	Posponer la vacunación Se recomienda separar la vacuna frente a COVID-19 de otras vacunas previas un mínimo de 14 días
	¿Padece inmunosupresión?	Vacunar igualmente. La respuesta inmune puede ser inferior
	¿Está recibiendo tratamientos frente a COVID19 (plasma de convalecientes, anticuerpos monoclonales o antivíricos)?	Posponer la vacunación 90 días
	¿Está recibiendo tratamiento crónico con anticoagulantes?	Precisa valoración: Si INR descontrolado, posponer la vacunación. Si INR controlado y estable pueden recibir la vacunación IM. Presionar 2 minutos tras la administración. Se recomienda utilizar la técnica en Z para la inyección.
	¿Está embarazada? ¿Tiene pensado quedarse embarazada? ¿Está lactando?	Posponer la vacunación Se recomienda esperar a quedarse embarazada dos semanas después de la segunda dosis. Vacunar y continuar con lactancia
	¿Qué edad tiene?	Fijarse en la edad mínima y máxima recomendada (personas nacidas entre 1966 y 2003)

Beneficios de la vacunación

La autorización de las vacunas frente a la COVID-19 implica que los beneficios de su administración superan ampliamente los riesgos conocidos.

Hay evidencia de la protección de la vacuna a partir de la tercera semana tras la administración de la primera dosis, aunque como cualquier otra vacuna puede que no proteja totalmente a todas las personas vacunadas.

La vacuna no puede provocar COVID-19 en la persona que la reciba. La administración de dos dosis de vacuna reducirá la probabilidad de enfermar, desarrollar enfermedad grave y morir. Sin embargo, las personas vacunadas deberán continuar adoptando las medidas preventivas para reducir la transmisión.

Reacciones adversas o efectos secundarios

Como todos los medicamentos, las vacunas pueden causar efectos secundarios. En el caso de presentarse, son leves o moderados y tienen una duración aproximada de 2 o 3 días. Entre estas reacciones, se incluye:

- Sensibilidad, dolor e inflamación en la zona de inyección.
- Fatiga.
- Cefalea.
- Dolor muscular y de articulaciones.
- Fiebre o escalofríos.
- Náuseas.

La vacuna frente a COVID-19 de AstraZeneca no supone un aumento del riesgo global de efectos trombóticos o formación de coágulos en sangre.

Qué hacer en caso de una reacción adversa o efecto secundario

Si después de la vacunación aparece alguno de los efectos enumerados en el apartado anterior puede utilizarse un tratamiento sintomático, con analgésicos o antipiréticos (como paracetamol) para tratar estos efectos, sin influir en la respuesta inmune. Si fuese necesario puede consultar con el personal de Atención Primaria.

Consulte a un servicio sanitario si presenta alguno de estos síntomas: dificultad para respirar; dolor en el pecho; hinchazón o dolor en un brazo o una pierna; dolor de cabeza intenso y persistente o que empeora más de 3 días después de la vacunación; visión borrosa o doble; múltiples hematomas pequeños (manchas rojizas o violáceas en la piel).

Si la reacción es leve también podrá notificarla de forma electrónica a través de la dirección web www.notificaram.es o en la página de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a través de su apartado enlaces de interés <Notificación de reacción adversa a medicamentos>.

Informe de vacunación

Si se requiere un informe de vacunación, estará disponible para su acceso y descarga una vez registrada la vacunación. Este informe podrá descargarse desde la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en el subapartado de *Historia de Salud Electrónica*. Para ello se necesita disponer de certificado digital o clave24.

<http://www.san.gva.es/web/portalhse/inicio>